Contexte géologique du Massif de Paimpont (35/56) resitué préalablement dans celui du domaine du Massif armoricain Excursions menées en 2015...

Encyclopédie de Brocéliande, Yves Quété : Le 25 janvier 2016

28/08/2015 10:42

Première Partie :

Les clés qu'offrent la Géologie pour comprendre les paysages et leur genèse.

0 40 km

Le Massif De Paimpont

Manche

« Bassin Parisien »

CNA CSA : Cisaillements Sud et Nord armoricain.

Plis synclinaux

Des faciès rocheux / classés par ancienneté.

- Sédiments mésozoïques
- Sédiments paléozoïques
- Sédiments précambriens
- Roches métamorphiques
- Roches magmatiques hercyniennes
- Roches magmatiques cadomiennes
- Failles majeures

Des faciès rocheux plissés et fracturés qui s'insèrent dans un contexte de déformations successives calées dans le temps :

Carte géologique simplifiée du Massif armoricain

Niveaux structuraux (d'après Mattauer, 1973).

Schéma théorique de répartition des structures en niveaux étagés, à un moment de la déformation de la croûte.

Apparition de surfaces nouvelles (plan de schistosité) introduisant une anisotropie dans la roche.

Les faciès rocheux qui affleurent (*plus ou moins déformés et fondus*) suggèrent vis-à-vis des contextes de leur genèse, des épaisseurs érodées ou des mouvements tectoniques verticaux (*cumulés*) de plusieurs km d'amplitude.

Néandertal : - 250 000 ans

III-IV

65 MA

II

245 MA

I

540 MA

X

Massif armoricain :
Nature des événements tectoniques (Orogenèses), calés dans le temps.

Permo-Trias :
Première pénéplaine du Massif armoricain avant la transgression du Jurassique moyen à supérieur.

L'ECHELLE Cours YQ / MST (1985)

CHRONO-STRATIGRAPHIQUE

Cycles orogéniques : A Pentevrien B Cadomien C Varisque

Datations radiogéniques (en millions d'années): 1:(2000) 2:(670-600-500?) 3:(640) 4:(550) 5:(340-290)

G Glaciation

Granites

Métamorphites

Volcanisme

Le Massif de Paimpont est situé dans le Domaine centre-armoricain.

Le Massif armoricain est une mosaïque d'éléments tectoniquement délimités, ce qui complexifie les reconstitutions paléogéographiques.

empilement de nappes (schistosité horizontale ou plissée), recoupé par les décrochements carbonifères domaine plissé, à schistosité verticale domaine plissé/écaillé, non-schistosé

Cette carte et cette coupe synthétiques du Massif armoricain mettent l'accent sur le découpage en grandes unités par les zones de cisaillement carbonifères, et l'intensité de la déformation et du métamorphisme varisques (Ballèvre, 2008). Ce document, s'il fixe le vocabulaire utilisé, ne rend cependant pas compte de l'histoire tectonique du Massif armoricain en termes de tectonique des plaques (où sont les sutures océaniques ? quels domaines continentaux ont convergé ? comment sont-ils identifiés ?).

	Domaine du Léon	Domaine nord-armoricain	Domaine centre-armoricain	Domaine sud-armoricain
Origine paléogéographique	Discutée	Armorica	Armorica	Empilement d'unités armoricaines et nord-gondwaniennes
Déformation varisque	Plusieurs épisodes de plis synschisteux	Plissement en général sans schistosité associée	Plissement synschisteux	Plusieurs épisodes de plis synschisteux
Métamorphisme varisque	Intense (éclogites, migmatites)	Nul ou faible	Faible à modéré	Faible à intense (éclogites, schistes bleus, migmatites)
Age des déformations majeures (synschisteuses)	Carbonifère inf. Dévonien sup. ?	Carbonifère sup.	Carbonifère sup. Dévonien sup.	Carbonifère inf.
Magmatisme syn-orogénique	Abondant	Absent	Modéré, associé aux zones de cisaillement	Abondant, en général de nature leucogranitique et localisé le long des zones de cisaillement
Magmatisme post-orogénique	« Granites rouges »	« Granites rouges »		

Déformations hercyniennes modérées

Caractéristiques majeures des quatre domaines structuraux du Massif armoricain. S'ils diffèrent aussi par leur origine paléogéographique, ils se distinguent avant tout par l'intensité de la déformation durant la tectonique varisque.

Ces différents domaines « varisques » juxtaposés, résultent de trajectoires différentes

Faciès rocheux, Chronologie et géoenvironnement : Utilisation d'outils adaptés.

Courbe isotopique de l'oxygène ($\delta^{18}O$) et enregistrement des paléotempératures basées sur les foraminifères benthiques sur les derniers 70 Ma
Noter que les étapes de refroidissement sont associées à des événements tectoniques
 (modifié de Shackleton & Opdyke, 1973).

Echelle simplifiée des temps géologiques, avec la répartition temporelle des cinq extinctions biologiques majeures et la courbe moyenne des températures, d'après Paleomap Project 2008.

Le Massif armoricain :
 Un continent qui a connu
 depuis 500 MA
 une trajectoire
 méridienne Sud > Nord.

Tillites de Feugueroles >

Fig. 5 - Paléogéographie fini-ordovicienne [d'après Scotese et al. 1979].
 En quadrillé : zones couvertes par l'inlandais - étoiles : dépôts glacio-marins.

Fig. 6 - Paléogéographie silurienne (Wenlock) [d'après Scotese et al. 1979].
 Tirets : milieux noirs riches en matière organique.

Reconstitutions paléogéographiques à la fin de l'Ordovicien (durant l'Hirnantien) et au Silurien (Paris et al., 1986). Notez la localisation d'une vaste calotte glaciaire au niveau de l'actuel désert saharien, ainsi que les dépôts glacio-marins sur le pourtour de cette calotte, à des latitudes aussi faibles (dans la paléogéographie ordovicienne) que celle du Massif armoricain.

Exemple de la représentation de la « glaciation africaine » sur la limite « Ordovicien-Silurien » Indices rocheux : dépôts glacio-marins alimentés en fragments par la fonte d'iceberg (Ex les « Tillites de Feugueroles »).

Fig. 4 : Suite de paléo-positions du Massif Armoricain. Les deux alternatives présentées pour le Cambrien (500-570 MA) correspondent aux deux courbes de dérive du pôle de la figure 3. Pour chaque époque, le massif est présenté dans ses paléolatitudes et orientation par rapport à l'axe Nord-Sud (vertical dans ce schéma). Aucune indication de paléo-longitude ne peut être obtenue à partir des données paléomagnétiques.

Objectif : Connaître et représenter les conditions d'évolution « paléogéographique » du substrat rocheux d'une région.

Figure 9.16 Schematic depth and structures of the weathered mantle in different climates; note the absence of treatment of maritime temperate climates.

Intensités d'altérations actuelles suivant la position «latitudinale»

Applicables au faciès rocheux anciens ?

Flux d'eau et température dissolvent les minéraux ce qui diminue la cohésion des matériaux et facilite leur érosion (*surtout en l'absence de végétaux*).

Les zonations climatiques latitudinales n'étaient pas les mêmes dans le passé que maintenant.

Calotte froide antarctique	Zones tempérées	Ceinture équatoriale d'eaux littorales chaudes	Zones tempérées	Calotte froide antarctique
----------------------------	-----------------	--	-----------------	----------------------------

Distribution latitudinale des températures moyennes annuelles (TAM) à la surface du globe de nos jours (ACTUEL) et à l'Eocène moyen (40 Ma) et zonations climatiques correspondantes (Bignot et Pomerol, 2010).

Sur le terrain : Eléments d'un puzzle

Profondeurs d'altération (*Paléocène-Eocène*) : ≤ 100 m
 Exemple sur granite. En fait souvent érodé et partiel.
 « Construction » d'un profil complet, à partir d'affleurements disséminés, synthétisés dans le « Log ».

• Les roches les plus anciennes de France

Principaux affleurements des roches les plus anciennes de France.

Ex Pleubian - Port Béni :

Gneiss œillés.

Quelques reliques très anciennes
(*Icartien* ou *Pentévrien*) Ages :
2000 MA / **615 MA** : **granodiorite**
cadomiennes.

Les gneiss anciens représentent des niveaux volcano-sédimentaires et granitoïdes à phénocristaux métarmorphisés.

Contact entre les gneiss anciens et la granodiorite plus récente, non déformée.

Datation isotopes U et Pb sur zircon : Age du magmatisme.

- Sédimentaire calcaire meuble
- Sédimentaire meuble
- Calcaire
- Sédimentaire
- Métamorphique basique
- Métamorphique
- Magmatique basique
- Magmatique
- Quartz

Les séries primitives
 Par opposition aux terrains
 de transition infr. moy. et supérieur

Les sédiments (*Briovérien*) sont issus du démantèlement de la chaîne cadomienne située plus au Nord et d'autres reliefs au Sud.

Le Protérozoïque : 2 MA (période « azoïque » < 540 MA)

2 orogénèses **pentévrien** puis **cadomien** (*intrusions granitiques à la fin*)

Reconstitution paléogéographique pour le Cambrien supérieur en vue équatoriale
(inspirée de McKerrow et Scotese, 1990, p. 7).

Le « *Brivérien* » issu du démantèlement de la **chaîne cadomienne** correspond à des sédiments déposés jusqu'au début du Cambrien : *A la base des bancs de poudingue portent des galets de roche magmatique datée [640 MA] et au sommet les sédiments remanient des zircons datés [540-520 MA] du Cambrien inférieur.* Le Brivérien correspond donc à une série sédimentaire déposée entre 630 et 520 MA.

Le Paléozoïque : 300 MA

Glaciation

MASSIF HERCYNIEN
Partout

CHAÎNE CALÉDONIENNE 420-360 MA

En limite Bretagne/Vendée et Europe septentrionale.

Glaciation

- Sédimentaire calcaire meuble
 - Sédimentaire meuble
 - Calcaire
 - Sédimentaire
 - Métamorphique basique
 - Métamorphique
 - Magmatique basique
 - Magmatique
 - Quartz
- Les séries primitives

2 orogénèses :
Intrusions granitiques
durant la phase hercynienne
(Chaîne varisque : 360-300 MA
Destruction du relief : 300-200 MA)

COTENTIN

CAEN

DOMFRONT

MENEZ - BELAIR

CROZON

MARTIGNE -
FERCHAUDSt JULIEN - de - V.
Flanc nord

D16

Levé de la géologie sédimentaire « Log » :
Les différentes coupes établies sur le terrain doivent être corrélées (faciès puis fossile puis marqueurs chronologiques) entre elles ...

Exemple de l'Ordovicien du Massif armoricain.

Reconstitution paléogéographique pour l'Ordovicien supérieur en vue équatoriale (inspirée de McKerrow et Scotese, 1990, p. 9).

450 MA : Plaques s'approchant « Europe » à 60° S

Reconstitution paléogéographique pour le Carbonifère supérieur en vue équatoriale
(inspirée de McKerrow et Scotese, 1990, p. 15).

300 MA : Gondwana et Laurussia rassemblés + Mer Paléo-Téthys
« Europe à l'Equateur »

Formations sédimentaires reconnues dans le Massif de Paimpont :

Lithostratigraphie de la Formation de Pont-Réan , d'après C. Le Corre, 1978

Synthèse géométrique des faciès sédimentaires caractérisant le Paléozoïque inférieur discordant sur le Briovérien « pénéplané » suivant une surface irrégulière. Les Grès armoricains marquant la **Transgression marine généralisée** : Elle vient du Sud et ennoie progressivement un continent..

Une interprétation possible des variations d'épaisseur des formations ordoviciennes basales (« séries rouges initiales » = Formation de Pont-Réan) en Bretagne centrale (Brun et al., 1991). Les « séries rouges » se seraient déposées dans des blocs basculés, indiquant une extension de direction NW-SE durant le Floien. Dans cette interprétation, la discordance à la base des séries ordoviciennes ne résulterait pas d'un raccourcissement crustal durant l'orogénèse cadomienne.

Une autre point de vue « dynamique » (1991) illustré par

Coupe schématique montrant l'environnement de dépôt du poudingue de Montfort et des schistes rouges de Pont-Réan sur le socle briovérien.

Interprétation géométrique de la discordance de la Formation de Pont-Réan sur le Briovérien, selon le faciès du conglomérat.

Conséquences d'une **tectonique extensive** : Voir diapo suivante :

Un modèle d'évolution géodynamique du Massif armoricain au cours de l'Ordovicien (modifié d'après Ballèvre et al., 2012).

↑
Différentiation des séries en Armorique : l'Océan Rhéique et l'Océan du Massif central fonctionnent

Massif Paimpont

Coupe AB montrant les plaques lithosphériques à croûte continentale (en majuscules) et les aires océaniques (en minuscules). L'Océan Iapetus commence à se refermer par subduction tandis que fonctionnent les deux branches de la Prototéthys, le Rhéique et l'Océan du Massif Central, isolant la plaque Armorique.

Disposition des blocs continentaux à l'Ordovicien.

Exemple de succession sédimentaire du Paléozoïque inférieur

Une autre exemple de construction géodynamique

Localisation d'un terrain dans un contexte géodynamique donné –suite-

[1] Coupe repérée sur la carte paléogéographique ci-dessus : la zone délimitée par un rectangle est détaillée par l

Les 3 stades de la tectonique des plaques (orogénèse).

Convergence (Complexe de Champ-toceaux : Domaine Sud armoricain)

[2]

Le bassin arrière-arc de Saint-Georges, à soubassement spilitique et carbonaté et remplissage turbiditique traversé par des sills de roches magmatiques acides.

Le Mésozoïque : 180 MA

Début de l'orogénèse « alpine »

OUVERTURE
DE L'ATLANTIQUE ET
DU GOLF DE GASCOGNE

- Sédimentaire calcaire meuble
- Sédimentaire meuble
- Calcaire
- Sédimentaire
- Métamorphique basique
- Métamorphique
- Magmatique basique
- Magmatique
- Quartz

Le Massif armoricain ne porte pas de formations sédimentaires secondaires : **Lacune ? Érosion ?**

Rien sur Paimpont..

Tithonien

148 Ma

Jurassique supérieur

Reconstitution paléogéographique pour le Trias en vue équatoriale
(inspirée des cartes du Paleomap Project de Scotese).

150 MA : Gondwana et Laurussia rassemblés + Mer Téthys
« Europe » à 35° N.

Reconstitution paléogéographique pour le Crétacé supérieur en vue équatoriale (inspirée des cartes du Paleomap Project de Scotese).

100 MA : Ouverture de l'Atlantique
« Europe » à 40° N.

Ere quaternaire

Néandertal : - 250 000 ans

Homme
Primate

Le Cénozoïque et Quaternaire : 65 MA

Une période récente étudiée avec des outils de plus en plus perfectionnés

L'orogénèse « alpine » actuellement en érosion

Aléas climatiques en Europe de l'Ouest, depuis la fin du secondaire

Chaud et humide : marécages

Dépôts argiles

- Eocène supérieur lacustre (gisements)

Dépôts calcaires / graben
Pas de pollen ?

Extension de la mer oligocène

● gisements

Institut de Géologie
Rennes < 1980

Dépôts sables coquillers

Tempéré à chaud humide

Dépôts marins

5 MA

Froid

● gisement (gisements non figurés)

Extension de la mer au Redonien (Pliocène)

Mer des sables rouges.

Extension de la mer des "sables rouges" (Pliocène)

50 km

Outils : Les argiles (E.C.) et les pollens (O.P.)

La compression pyrénéenne crée un « bombement » à surface plane, exondé soumis à l'altération.

Ouverture du Rift Ouest Européen : Affaissement du Massif armoricain décapage des altérites – transgressions marines localisées

D33

Grandes glaciations

MA 65 53 350 m 34 23.5 15 11 5 1.75

AC

NM

Massif Armoricain

Transgression : Avancée de la ligne du rivage.

Cénozoïque et Tertiaire : Variations Altitude continentale – Niveau eustatique

Une étude récente (*Bassin rennais*)
Ouvrage « Cinergy » : Un forage
carotté de 480 m de profondeur :
montrant le Briovérien altéré situé sous
une couverture (épaisseur 400m) sédi-
mentaire, essentiellement argileuse (1)
(Eocène au Pliocène soit 40 MA à
aujourd'hui). Le Miocène (~ 20 MA)
se marque par les Faluns (anciennes
Carrière à chaux).
(1) Série compactée, les épaisseurs ini-
tiales étant 2 à 3 fois plus importantes.

Environnements de dépôts et proposition de découpage séquentiel dans le bassin de Rennes.

- 1. Domaine fluviomarinal correspondant à la formation argilo-sableuse ;
- 2. Fond de lac ;
- 3. Bordure de lac ;
- 4. Marais ;
- 5. Plaine d'inondation ;
- 6. Baie confinée/ lagune ;
- 7. Vasière ;
- 8. Palustre /marais.

Reconstitution paléogéographique du Bassin rennais au tertiaire (Oligocène).

Un milieu lacustre alternant entre un système « ouvert » relié à un fleuve et un milieu « fermé » anoxique.
 Au sommet de l'Eocène les conifères puis les argiles smectiques signalent un refroidissement puis un climat plus aride.

Des invasions marines
Plus ou moins marquées

Oligocène
(Rupélien)
28-34 Ma

Extension de la Mer des faluns (d'après M. Ballèvre, 2008).

Une invasion marine franche mais localisée

(Langhien) 14 Ma

La Méditerranée est à sec ←

↓ 23 MA

Des sédiments marins / estuariens ?

Tendance rétrogradante - Miocène supérieur

MFS - Piacenzien

= Plaisancien

Les reliques
sédimentaires
mio-pliocènes :
Ebauche
D'un paysage ?

Inversion de tendance - Miocène terminal?

Tendance rétrogradante - Pliocène supérieur

Une ligne de « par-
tage des eaux –
« estuarienne »,
guidée par la Faille
(N140) de Ques-
soy Nort sur Erdre

estuaires internes proximaux

cônes alluviaux

paléoligne de partage des eaux

estuaires internes distaux

rivières en tresse ou
faiblement sinueuses

paléocourants

estuaires ouverts

Au Mio-Pliocène (*sables rouges et faluns redoniens*), les paysages très différents de l'actuel, étaient constitués d'épandages sableux associés à des cônes ou plaines alluvionnaires peu sinueuses emplissant des paléovallées faiblement incisées (**10-20m**) et larges (**700m**). Ces vallées se sont mises en place au Tortonien (**11MA**) et remplies au Reuvérien (**3MA**).

D40

Le **Pleistocène moyen/supérieur (< 1 MA)** est caractérisé par une surrection différentielle du Plateau Centre-Bretagne en panneaux limités par des failles actives qui sont aujourd'hui la cause de nombreux séismes.

Les **rivières actuelles**, en incision érodent le socle en place, en dehors des placages mio-pleiocène et révèlent donc un réseau hydrographique indépendant. Ce réseau concerne également le **socle dans sa partie émergée** « *Précontinent de Pinot* » jusqu'à la cote actuelle de **- 50 m**.

Le réseau actuel est plus incisé (60-100 m) que le réseau précédent, le niveau des terrasses (*lits successifs du cours d'eau*) pouvant marquer l'existence de mouvements verticaux du socle.

Age du réseau hydrographique actuel : < 3 MA

Il remplace un autre réseau antérieur « Mio-Pliocène » (10 MA)

A incision égale, la pente des versants est proportionnelle à la densité de drainage

Granite, British Guiana

Granite, South Dakota

Shale, Utah

Shale, South Dakota

One Mile
Scale

Phyllite, Alabama

Densité de drainage liée à la « Géologie »
En Bretagne cette densité est de l'ordre d' 1 km

Figure I.4 Représentation à la même échelle de différents réseaux de drainage en fonction de la lithologie du substrat. Les différences de taux d'occupation de la surface par les réseaux correspondent à différentes densités de drainage (d'après Ray et Fischer, 1960, in Chorley et al., 1984).

5 MA

CHRONOLOGIE, CLIMATS, INDUSTRIES PREHISTORIQUES ET HOMMES FOSSILES
 Seules les deux dernières glaciations ont laissé des traces notables
 La courbe climatique a été déduite de l'étude des petits rongeurs

Epoque	Etage	Glaciation	Date (années)	Stades isotopiques
Holocène			Aujourd'hui	1
Pléistocène	Supérieur		Tardiglaciaire	2 à 5
			Würm	
			Riss-Würm	
			Riss	
	Moyen		Mindel-Riss	6 à 19
			Mindel	
			Günz-Mindel	
	Inférieur		Günz	20 à 64
			Donau-Günz	
	Inférieur	récent	Calabrien	20 à 64
ancien		Gélasien		
		Donau	2 588 000	65 à 103

Cadre chronologique simplifié du Quaternaire associé aux glaciations alpines et aux stades isotopiques.

La ligne continue représente l'extension maximum des glaciers rissiens, la ligne en tiretés celle des glaciers würmiens.

(il y a environ 20 000 ans)
l'homme occupe le Sud de l'Europe

Le cycle d'érosion glaciaire d'après W.M. Davis (Extrait de W.M. Davis, 1906)

D44

A- Normally eroded mountain mass, not affected by glacial erosion.
B - The same mountain mass, strongly affected by glaciers which still occupy its valleys.
C - The same mountain mass, shortly after the glaciers have melted from its valleys (Davis, 1906)

Profil schématique d'un glacier alpin et de son lit Extrait de De Martonne (1947)

Les plages blanches représentent le glacier alpin, il est épais dans les zones d'ombilic et plus mince au passage des verrous rocheux. Les plages hachurées correspondent au substrat rocheux. Les plages grisées montrent l'inégalité de l'érosion glaciaire, elle est maximale au droit des ombilics et minimale au droit des verrous.

La fonte du glacier fragilise la paroi rocheuse qui s'érode.

Vallée en auge / post glacier : A rechercher dans le cercle d'extension des glaciations quaternaires.

Dernier Maximum Glaciaire. Cette période est très froide et sèche. La forêt et les régions boisées sont presque inexistantes, à l'exception d'une partie de l'Europe méridionale. Ces conditions ont été les mêmes durant la période comprise entre 22 000 et 13 000 ans.

Reconstitution : Climat et limite de l'Océan atlantique : - 18 000 ans
Altitude moyenne Bretagne : 220 m
Reprise de l'érosion.

Situation du continent au dernier **optimum glaciaire**.

Le **précontinent (*Manche incluse*) est entièrement exondé**, les vents issus du Nord provoquent le dépôt des loess (*limon éoliens*).

Younger Dryas. Cette période froide et sèche entraîne la disparition de la couverture boisée de la période comprise entre 12 000 et 11 000 ans. Elle est remplacée par la steppe et la toundra. La fin soudaine du Younger Dryas au environ de 10 000 ans marque le commencement de l'interglaciaire holocène.

Reconstitution : Climat et limite de l'Océan atlantique : - 10 000 ans
Altitude moyenne Bretagne : 165 m

Périodes climatiques et Zonation pollinique (Zone)

Courbes des variations apparentes du niveau de la mer en Bretagne depuis 10 000 ans
(Modifié d'après Morzadec, 1974)

Variation du niveau marin depuis 9000 ans (*fluctuations périglaciaires*)

👉 Les vallées armoricaines sont **en incision** durant les chutes de niveaux marins et **en comblement** pendant les remontées

- 25 m
8.000 ans.

La Bretagne

La Loire

Tracé de
l'ancien
rivage

L'océan
Atlantique

**Reconstitution : Climat et limite de
l'Océan atlantique : - 8 000 ans
Altitude moyenne Bretagne : 125 m**

D48

Holocène. La forêt de type caducifoliée recouvre à nouveau une grande partie de l'Europe. La surface forestière est plus importante qu'à l'heure actuelle avec le développement de clairières herbacées. Les conifères sont plus abondants vers 8000 ans qu'actuellement

D'après Adams, 2000

<http://www.esd.ornl.gov/projects/qen/>

Le climat depuis 5000 ans en Europe "An mil"

Utilisation du réseau altimétrique : Différence d'altitude entre le début la fin du XXème siècle : Marqueur d'une surrection (*composante verticale*) variable dans l'espace (*amplitude de l'ordre du mm/an*).

En jaune : Ligne de partage des eaux

Le relief actuel : Une lecture à plusieurs échelles

Systèmes alluvionnaires emboîtés

Systèmes alluvionnaires étagés

Position altimétrique au-dessus du cours actuel

Fx 10-20 m
Fy 2-10 m

Relations morphologiques entre les différents systèmes alluvionnaires

Utilisation des terrasses comme Indice de réactivation tectonique

Exemple de la Vilaine

Terrasse étagée (A) et terrasse emboîtée (B)-Derruau (1996).

Répartition altitudinale des terrasses entre le Bassin de Rennes et le Plateau du Sud de Rennes (cf. localisation sur la figure IV.5). Dans ces deux secteurs, deux chutes du niveau de base majeures sont enregistrées par les terrasses (diagrammes du bas). La première (entre Fw et Fx) est identique dans les deux cas et les terrasses sont étagées. Par contre, les terrasses Fx et Fy sont emboîtées dans le Bassin de Rennes tandis qu'elles sont étagées au sud. La deuxième chute du niveau de base a donc une intensité différente selon le secteur considéré. Ceci implique l'existence de mouvements verticaux sur la faille de Pont-Réan après le dépôt des terrasses Fx. Les lignes pointillées schématisent la position des paléo-profils longitudinaux.

Zone faillée
Nord-Armoricaine

Faille de
Quessoy-Nort sur Erdre

Faille
Kerforne

Ligne de
partage des eaux

RENNES

Forme du
relief
(Outil MNT)

Zone faillée
Sud-Armoricaine

Cisaillement
Sud Armoricaïn

**LA PARTIE IMMERGEE
N'EST PAS PRISE EN COMPTE**

**Le début de la « réflexion »
(début 90 : Stéphane Bonnet
Géosciences Rennes) :**

**L'incision : Le marqueur des mouvements « relatifs »
verticaux -> reprise érosive des cours d'eau.**

PROFILS TRANSVERSAUX :

Hypothèse :
Surrection relative du
compartiment Ouest
limité par une Faille N140°E.

Exemple (la ZBSA) relief « jeune » caractérisant une faille ancienne (*hercynienne*) Réactivée – *Utilité de l'outil SIG.*

**Le réseau de fractures (*hercynien*)
localement réactivé.**

*Diapositive
précédente*

Carte de fracturation du Massif Armoricain (Vignerresse, 1988) d'après l'interprétation de la gravimétrie.

Moteur de la réactivation : Localisation des séismes.

Massif armoricain : Des D58 blocs limités par des failles actives, avec des mouvements de bascule, à composantes verticales variables.

En contexte compressif Sud > Nord

- QNE : Faille de QUOSSOY NORT/ERDRE
- ENA : ESCARPEMENT NORD ARMORICAIN
- CSA : CISAILLEMENT SUD ARMORICAIN
- GBI : GLACIS PLAINE DE BELLE-ILE
- SEQ : Faille de SCORFF-ETEL-QUIBERON

Guillocheau *et al.* (2003)

- Valeur calculée à partir de l'incision différentielle des vallées pléistocènes moyen/supérieur (Bonnet, 1997 ; Bonnet *et al.*, 2000)
- Valeur mesurée à partir de la différence d'altitude de l'inondation maximale piacenzienne (Brault *et al.*, 2003)
- ◉ Valeur mesurée à partir de l'incision différentielle des vallées fossiles sud armoricaines

Cette tectonique de blocs contrôle la dynamique du réseau hydrographique actuel :

Rajeunis érosifs au Nord scellés comblés au Sud... d'autant qu'ils sont actuellement ennoyés.

Abrasion marine depuis la dernière transgression
Incision fluviale

grands traits morphologiques d'un cours d'eau, en profil et en plan.

Expressions de la liberté de divagation du cours d'eau reliée à la pente et la dureté du substrat.

Profil en long

Le tracé en tresses est symptomatique d'une forte charge alluviale. Le lit est très large et plat. Plusieurs chenaux instables sont séparés par de nombreuses îles. Ces chenaux gardent sensiblement la direction de l'axe de la vallée et transportent une charge solide dont la part grossière est importante. Le style en tresse est peu fréquent en France : on le rencontre par exemple sur la Durance, l'Asse, la Bléone, l'Ain, le gave de Pau, certains tronçons de la Loire et l'Allier .

Terrasses / Ecoulements en tresses synchrones des périodes de dégels.

Exemple la Vilaine S. Bonnet

↑ Répétition du Faciès.

Niveaux sableux à litages obliques
Mégarides 2D et 3D indices d'une rivière en tresses au profil très penté.

Conglomérats proximaux à la base et distaux au sommet : **Coulées de Solifluxion**

Logsynthétique de la terrasse de l'Abreuvoir une séquence I+II+III entre 1,50 et 2,50 m.

STADE 1 - DESTABILISATION DES VERSANTS ET SOLIFLUXION

D61

STADE 2 - SOLIFLUXION ET ECOULEMENTS EN TRESSE

STADE 3 - ARRET DES APPORTS DE VERSANTS / INCISION

Figure 5 : Schéma de l'évolution pédologique du sol de surface en milieu loessique, de la fin du Pléniglaciaire à l'Holocène.

— Genèse d'un paléosol : > 10 000 ans —

Seconde Partie :

Le Massif de Paimpont
Excursions menées en 2015.

Localisation du Massif de Paimpont dans le contexte géologique breton

- Quaternaire : Alluvions
- Cenozoïque : Sables
- Cretace
- Jurassique
- Trias
- Paleoz sup : Schistes et grès
- Paleoz moy : Schistes et grès
- Paleoz inf : Schistes et grès
- Proterozoïque : Schistes et grès
- Micaschistes
- Orthogneiss : Gneiss
- Plutonisme : Granites

Les cartes géologiques
au 1/50 000 : D63

CARTE
GÉOLOGIQUE
DE LA FRANCE
À 1/50 000

2008

SAINT-MÉEN-
LE-GRAND

CARTE
GÉOLOGIQUE
DE LA FRANCE
À 1/50 000

1999

MONTFORT-
SUR-MEU

CARTE
GÉOLOGIQUE
DE LA FRANCE
À 1/50 000

2009

GUER

CARTE
GÉOLOGIQUE
DE LA FRANCE
À 1/50 000

2004

PLOËRMEL

- Cénozoïque**
- Éocène inférieur à Pliocène
- Paléozoïque**
- Unités de Paimpont et Réminiac
- Silurien
 - Ordovicien : formations volcaniques
 - Ordovicien moyen et supérieur
 - Ordovicien inférieur : Formation du Grès armoricain
 - Ordovicien inférieur : Formation de Pont-Réan

- Protérozoïque**
- Sédiments briovériens
 - Métasédiments briovériens (contact avec granites cadomiens)
 - Métasédiments briovériens (contact avec granites ordoviciens et varisques)
 - Domaines métamorphiques
- Formations plutoniques**
- Granites carbonifères
 - Granitoides ordoviciens
 - Granites cadomiens

0 10km

- Tracé de la coupe
 - Axe anticlinal
 - Axe synclinal
 - Faille principale
 - Accidents majeurs
- C.N.A. : cisaillement nord-armoricain
C.S.A. : cisaillement sud-armoricain

Schéma structural (Feuille de Ploërmel)

Protérozoïque terminal - Paléozoïque basal

BRIOVÉRIEN

* Sur la feuille Malestroit, il semble (sondage) que les laves de la Formation de Marsac (KM) surmontent des séries rouges et leur sont donc postérieures, à priori.

Les laves dacitiques ne sont schématiquement représentées intrusives qu'à travers b3 pour le Briovérien comme cela est observé sur la feuille Ploërmel (Romfort - Lambeau de la Bresselais)

COLONNE STRATIGRAPHIQUE SYNTHETIQUE

Formations briovériennes

b3S : alternances d'argilites et de grès fins à moyens. Les niveaux gréseux sont peu épais (<20cm) et le rapport siltites-argilites/grès est fort.

b3Cg : intercalations de lentilles de conglomérats de type Gourin

b3G : alternances d'argilites et de grès fins à moyens. Les niveaux gréseux sont parfois très épais (>5m) et le rapport siltites-argilites/grès est très important.

b3Cg : intercalations de lentilles de conglomérats de type Gourin

b2S : alternances d'argilites, de siltites et de grès fins à grossiers. Les niveaux gréseux sont peu épais (<10cm) et le rapport siltites-argilites/grès est fort.

b2Cg : intercalations de lentilles de conglomérats et microconglomérats

b2G : alternances de siltites et de grès grossiers. Les niveaux gréseux sont épais (>1m) et le rapport siltites/grès est faible.

b2Cg : intercalations de lentilles de conglomérats et microconglomérats

b1 : "Série de Néant" : alternances d'argilites homogènes, de grès grossiers en bancs parfois épais et chenalissants et localement de niveaux conglomératiques ou microconglomératiques

La succession b1 / b2 / b3 a été introduite dans la Notice de la Feuille de Ploërmel.

En face inférieure de couche sédimentaire : Figures de « charge » syn-sédimentaires déformées dans le plan de schistosité (*le plan de cassure du banc*).

b 1/2/3 S ou G : Alternance de sédiments fins (*siltites*) et plus grossiers (*grès*), plus ou moins indurés différenciés ici par l'altération atmosphérique.

Faciès de siltites et grès briovériens :
Sédiments fins « rythmiques ».
Figures de courants, action de la houle
et des vagues..

Environnement sédimentaire essentiellement « silteux » avec quelques intercalations de grès « turbidiques » et schistes à galets. L'existence de niveaux rubéfiés suggère une émergence finale suivie d'une paléo altération, reprise dans les premiers sédiments (*rouges*) de la transgression paléozoïque (E. Denis 1988, J-L Bonjour 1989).

Faciès à galets de quartz jointifs : Poudingue de « Gourin »
souvent vu en indices « Pierres volantes »

Dans le contexte (*bS* ou *bG*) argilites siltites et grès fins, qui caractérisent le Briovérien, ces facies plus grossiers situés dans un environnement « turbiditique distal » (voir diapo précédente) témoignent d'un système fluvio-deltaïque situé plus en amont (Notice Feuille géologique de Janzé).

Visite	NUM	Sigle Géol	Quoi	D70	Qualité
28/7/15	11	b1	Carrière de La Noë-Vermand : Briovérien gréseux en exploitataion		TB
28/7/15	12	b1	Chemin de halage : affleurement Briovérien gréseux (anciennes carrières sur le plateau - non visitées)		B
28/8/15	39A	b1	Le Rocher : Briovérien en banc de siltites fins : talus chemin		TB
28/8/15	39B	b1	Le Rocher : Briovérien en banc fins : ancienne carrière		B
28/8/15	39C	b1	Le Rocher : Briovérien en banc fins : ancienne carrière bien dégagée		TB
17/8/15	15	b1 / O2B	Coupe Brangelin : Briovérien (au niveau du village pas d'affleurement)		paysage
2/7/15	06	b2G	Moulin de Boissy : Briovérien gréseux		B
28/7/15	10	b2G + b2S	Moulin du Bois de la Roche : Eboulis briovérien (solifluxion)		B
2/7/15	05	b2S	SE Néant Briovérien : siltites sur talus de route		B
17/8/15	20	b2S	Schistes briovériens dans fossé		B
17/8/15	21	b2S	Suivi fossé talus Fragments de siltites briovéroienne (pas de trace de poudingue de Monfort proche)		M
28/8/15	26	b2S	Eboulis fragments briovériens (éboulis)		B
28/8/15	31	b2S	Sortie plateau Val sans retour : vue sur Tréhorenteuc		paysage
28/8/15	32	b2S	Affleurement Briovérien siltite dominant banc gréseux dans ornière chemin		TB
28/8/15	33	b2S	Excavation dans siltites briovérienne		éphémère
2/7/15	08	b3S	Campénéac Briovérien schisteux		B
16/10/15	50	bG	Site de La Harelle : Briovérien en bancs (grès et siltites) - Circuit J. Plaine		TB
16/10/15	45	bS	Carrière les Grippaux - site fermé protégé ancienne ardoisière (fragments visibles lotissement au Nord) - Circuit J. Plaine		AB
16/10/15	46	bS	Ancienne carrière schistes briovérien ardoisiers - site accessible mais en domaine privé boisé sombre - Circuit J. Plaine		B
2/7/15	04	Cg	Indices Poudingue de Gourin		AB

Affleurements de Briovérien : Sites visités en 2015

PALEOZOÏQUE

ORDOVICIEN

Llanvirn - Llandeilo
(Caradoc)

Arénig moyen à supérieur

Arénig inférieur

Formation de Traveusot

O2c-5a

Siltstones sombres et
grès finsFormation du Grès armoricain

O2abc

Grès et quartzites à interlits
argilo-micacés

F : Formations Fossilifères

Formation de Pont-Réan

Membre de Montfort

O2P - Conglomérat polygénique de Montfort

O2B - Siltstones micacées pourpres

Membre de Courouët

O2C - Grès de Courouët

* Sur la feuille Malestroit, il semble (sondage) que les laves de la Formation de Marsac (KM) surmontent des séries rouges et leur sont donc postérieures, à priori.

Les laves dacitiques ne sont schématiquement représentées intrusives qu'à travers b3 pour le Briovérien comme cela est observé sur la feuille Ploërmel (Romfort - Lambear de la Bresselais)

Formations
paléozoïques
reconnues
dans le
Massif de
Paimpont

Contact Paléozoïque sur Briovérien
Discordance tectonique. D73

Par rapport à D20 où sommes-nous placés ?

INTERPRETATION du contact Paléozoïque / Briovérien applicable au site de La Marette

Affleurements du **Conglomérat de « Monfort »** à proximité de Monfort.

A noter : Les bancs peu pentés, l'érosion différentielle et la schistosité de fracture

Formation de Pont-Réant : Siltites indurées « Dalles pourprées »

**Les traces,perpendiculaires
à la surface des bancs :**

Les énigmatiques
« cupules »

Les terriers (*skolithes*)

Grès de Courouët (*à venir : Voir carrières sur Monterfil*)

Visite	NUM	Sigle Géol	Quoi	D77	Qualité
2/7/15	07	O2B	Landes rennaises Dalles pourprées		B
28/7/15	13	O2B	Lande des vignes : Dalles pourprée trace chariot		B
17/8/15	16	O2B	Coupe Brangelin : Dalles pourprées (affleurement dans fossé ?)		paysage
17/8/15	19	O2B	Le Plessis : Dalles pourprées en bancs		B
17/8/15	22	O2B	Suivi fossé talus (facies divers du Briovérien)		B
28/8/15	27	O2B	Dalles pourprées bancs épais		B
28/8/15	28	O2B	Val sans retour bas le la pente : Dalles pourprées bancs		paysage
28/8/15	29	O2B	Val sans retour montée : Dalles pourprées bancs		B
28/8/15	30A	O2B	Val sans retour plateau : Dalles pourprées bancs		B
28/8/15	30B	O2B	Val sans retour plateau : Dalles pourprées bancs		B
28/8/15	30C	O2B	Val sans retour plateau : Dalles pourprées bancs		B
28/8/15	34	O2B	La Ville aux Feuvres : Dalles pourprée en fragments dans les champs		M
28/8/15	35	O2B	La Ville aux Feuvres : Dalles pourprée - ancienne carrière noyée		B
28/8/15	36	O2B	Le Rocher : Allée couverte : Dalles pourprées marquées de cupules		paysage
28/8/15	37	O2B	Le Rocher : Dalles pourprées en bancs marqués de cupules		B
28/8/15	38	O2B	Le Rocher : Dalles pourprées en bancs (moins individualisés)		B
28/8/15	40	O2B	La Prise : Pierres couchées en forÛt : Poudingue de Monfort en place ?		paysage
28/8/15	41	O2B	Chateau de Comper : Bancs sub-horizontaux Dalles pourprées		B
28/8/15	42	O2B	Lande de Trékoët : Carrière : Dalles pourprées en bancs + faille		TB
2/7/15	09	O2B / b2S	Lidrio Contact Paléoz/Briovérien (dans fossé incertain)		AB
2/7/15	01	O2B sur bG	Carrière de La Marette : Discordance Paléozo'que sur Briovérien (****)		TB
17/8/15	18	O2P	Les 3 roches : Poudingue de Monfort (en place ? remanié)		en place ?
16/10/15	47	O2P	rive Ouest ruisseau ancienne carrière : Poudingue de Monfort - site accessible mais en domaine privé boisé sombre - Circuit J. Plaine		B
16/10/15	49	O2P	Site de La Harelle : Poudingue de Monfort - carrière accessible mais déchets verts - Circuit J. Plaine		TB

Affleurements Formation de Pont-Réan : Sites visités en 2015

Grès quartzitique exploité en carrière (*site du Valet – Société Carrières de Brandefer*)

D79

Bancs quartzitiques – inter lits micacés ^.
< Figures de courant (*Carrière de La Moutte*)

Le Grès armoricain affleure majoritairement dans les champs, sous la forme de « pierres volantes ».

Visite	NUM	Sigle Géol	Quoi	Qualité
2/7/15	02	O2	Affleurement Grès armoricains (bancs)	B
2/7/15	03	O2	Carrière de La Moutte : Grès armoricains nombreuses figures sédimentaires (en exploitation épisodique)	TB
28/7/15	14A	O2	Carrière Buffe fort (boisée) Grès armoricains exploitation ancienne	M
28/7/15	14B	O2	Carrière de la Noë (boisée) Grès armoricains	M
17/8/15	17	O2	Coupe Brangelin : fragments Grès armoricains (pierres volantes dans champ)	paysage
28/8/15	43	O2	Paimpont : usine embouteillage : ancienne carrière dans Grès armoricains (excavation profonde dans le bois sombre)	boisé
16/10/15	44	O2	Carrière en activité du Valet-Vaurifier : Grès armoricain Visite guidée avec Frédéric Habasque	TB
16/10/15	48	O2	Ancienne carrières de Grès armoricain - boisé et sombre - Circuit J. Plaine	B

Affleurements Formation du Grès armoricain : Sites visités en 2015

CENOZOIQUE

NEOGENE

Vu en 2015

PALEOGENE

Dépôts fluviatiles

Fz - Limons de débordement, chenaux et alluvions récentes (Holocène)
 Fz - Alluvions récentes sur isaltérites de substrat identifié

Fy - Alluvions de basse terrasse (Pléistocène supérieur ?)

Fx - Alluvions de moyenne terrasse (Pléistocène moyen à supérieur ?)

Fw - Alluvions de haute terrasse (Pléistocène inférieur ?)

Fz

Fy

Galet à
bords arrondis

Visite NUM Sigle Géol Quoi

Qualité

17/8/15 25 Fw Paysage terrasses emboîtées (petits galets émoussés)

TB

17/8/15 23 Fy Paysage terrasses emboîtées (galets gréseux émoussés)

TB

17/8/15 24 Fz Paysage terrasses emboîtées (colluvions limono argileuses)

TB

Élément de formations superficielles Dépôts actuels – Reliques des aléas climatiques récents :

Remarque : Ces coulées de boues peuvent recouvrir ou détruire des terrasses en place.

Dépôts éoliens

Limons éoliens, loess
1 - loess sur isaltérites de substrat identifié
2 - loess sur allotérites de substrat identifié

Dépôts de versants

Dépôts de versants, ruissellement dominant (colluvions)

Dépôts périglaciaires

Facies Périglaciaire

ALLOTÉRITES
Structure originelle de la roche non conservée :
perte de masse et de volume

ISALTÉRITES
Structure originelle de la roche conservée :
perte de masse sans perte de volume

ROCHE SAINE

- Coulée de débris
- Pergélisol

Profil d'altération type
(d'après R. Wyns - Géochronique n° 59, 1996, modifié)

Coulée « boueuse »
(Allotérite)

Fluage (roche entraînée par le poids de la coulée)

Cassure

Site sur Betton :
A retrouver sur Paimpont ?

**Détail coulée boueuse
de solifluxion :**
**Fragments centimétriques anguleux
emballés dans un « ciment »
sablo-limono-argileux**

A lire : Les documents joints.

- Les **4 feuilles géologiques** (+ *les notices 1999 – 2004 – 2008 – 2009* [1]).
- **3 thèses** : Bonnet S. 1998 – Brault N. 2002 – Menier D. 2004.
- **3 présentations** : A : Structures sédimentaires B : Litho et bio stratigraphie C : L'échelle stratigraphique internationale.
- **4 articles** sur la géologie du Massif armoricain : 1997 et 2014 : Briovérien et Paléozoïque, 2003 et 2007 : Secondaire à actuel.
- **1 rapport** : BRGM Le Forage Cinergy.

[1] *Les notices sont disponibles sur le site « **Info Terre** » du BRGM.*

Les prochaines sorties :

- Le **19 février 2016** : Autour de l'ancien étang de Careil.
- Autour de Monteneuf – Guer – Comblessac (*Ellipse de Réminiac*).
- Autour des sites de métallurgie médiévale en forêt de Paimpont.